

Правила использования изделий медицинского назначения при оказании первой помощи

1. Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки для оказания первой помощи работникам и обучающимся (далее – Состав аптечки), не подлежат замене.

2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения, входящих в Состав аптечки, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить.

Все используемые медикаменты записывать в Журнал регистрации использования изделий медицинского назначения при оказании первой помощи для своевременного пополнения.

3. Аптечка для оказания первой помощи подлежит комплектации изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

4. Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам и обучающимся (п.4.2 Состав аптечки) должны предусматривать описание (изображение) следующих действий:

а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (п. 3.3 Состав аптечки). При наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую (п. 3.4 Состав аптечки);

б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п. 1.1. Состав аптечки) выше места повреждения с указанием в записке (п. 4.4-4.5 Состав аптечки) времени наложения жгута. Наложить на рану давящую (тугую) повязку (п. 1.2-1.12 Состав аптечки);

в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» или карманной маски для искусственной вентиляции легких «Рот-Маска» (п. 2.1. Состав аптечки);

г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя для этого стерильные салфетки (п. 1.9 Состав аптечки), бинты (п. 1.2-1.7 Состав аптечки) или пакет перевязочный стерильный (п. 1.8 Состав аптечки).

При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п. 1.9 Состав аптечки) и закрепить её лейкопластырем (п. 1.12 Состав аптечки).

При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10-1.11 Состав аптечки);

д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, которым оказывается первая помощь, использовать салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые (п. 3.2 Состав аптечки).

е) покрывало спасательное изотермическое (п. 3.5. Состав аптечки) расстелить (серебристой стороной к телу для защиты от переохлаждения; золотой стороной к телу для защиты от перегрева), лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить.